

# Auswertung der Katamnesedaten zum Entlassungsjahrgang 2011 - Alkohol-Einrichtungen - Stand: August 2013

## Einführung



- Für die Auswertung wurden nur Einrichtungen berücksichtigt, bei denen die Rückläuferquote mindestens 25% beträgt.
- Für die katamnestische Erfolgsquote nach DGSS 4 wird zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Studien ein Mindestrücklauf von 45% festgelegt. Daher ist der Umfang der Stichprobe bei diesem Item kleiner.
- In der vorliegenden Auswertung wurden nur die männlichen Bezeichnungen verwendet, die weiblichen sind jeweils mit gemeint.



## Dokumentations-Ausschuss

- Gunther Eichstädt, Fachklinik Bassum (Basisdaten Tageskliniken)
- Eberhard Heining, Rehabilitationseinrichtung Lörrach (Basisdaten Adaptionen-Einrichtungen)
- Dietmar Huland, Fachkrankenhaus Höchsten (Basisdaten Gesamtauswertung)
- Viktoria Kersch, Fachklinik DO IT! (Basisdaten und Katamnese Drogen-Einrichtungen)
- Dr. Andreas Koch, Geschäftsstelle des ‚buss‘ (Layout, Gesamtreaktion, Katamnese)
- Claudia Lingelbach-Fischer, Geschäftsstelle des ‚buss‘ (Unterstützung bei Datensammlung und Auswertung)
- Jens Medenwaldt, Redline DATA (Statistik)
- Martina Tranel, Fachklinik Haus Möhringsburg (Katamnese Alkohol-Einrichtungen)
- Dr. Thilo Wagner, Fachkliniken Mahlertshof und Mackenzell (Basisdaten Alkohol-Einrichtungen)

3



## Struktur der Auswertung

- Teil 1 – Überblick
  - Rückläuferquote
  - Abstinenzquoten
- Teil 2 – Sozio-demografische Daten
  - Vergleich Gesamt-Stichprobe und Katamnese-Stichprobe (Antwörter)
- Teil 3 – Häufigkeiten Katamnese-Stichprobe
- Teil 4 – Kreuztabellen
  - Behandlungs-Beginn und Katamnese-Zeitpunkt
  - Sozio-demografische Daten und Abstinenz

4

## Teil 1

| Nr.                 | Merkmal  |
|---------------------|--|
| <b>1. Überblick</b> |  |
| 1.1                 | Rückläuferquote (nur für Einrichtungen >25%)             |
| 1.2                 | Abstinenzquote 1 (Einschätzung nach Katamnese-Protokoll) |
| 1.3                 | Abstinenzquote 2 (Selbsteinschätzung nach Frage 1.6)     |

## 1.1 Rückläuferquote

| Klinik                                    | Rückläufer | Fälle |
|---|------------|-------|
| Reha-Klinik Lindenhof – Alkohol           | 56,9%      | 102   |
| Fachkrankenhaus Hansenberg                | 56,6%      | 327   |
| Fachklinik Langenberg                     | 54,8%      | 93    |
| Fachklinik Legau                          | 54,8%      | 115   |
| Fachklinik Haselbach                      | 54,0%      | 113   |
| Tagesrehabilitation Bodensee-Oberschwaben | 53,4%      | 58    |
| Luzin-Klinik                              | 53,2%      | 218   |
| Tagesklinik Northeim                      | 52,5%      | 40    |
| Tagesrehabilitation Ulm                   | 52,5%      | 61    |
| Klinik am Park Bad Lippspringe            | 52,0%      | 204   |
| Fachklinik Erlengrund                     | 50,4%      | 258   |
| Tagesklinik Braunschweig                  | 49,5%      | 111   |
| Fachklinik Hirtenstein                    | 48,9%      | 268   |
| Fachklinik Fischerhaus                    | 48,2%      | 195   |
| Fachklinik Schönau                        | 47,9%      | 117   |
| Fachklinik Freudenholm-Ruhleben           | 47,8%      | 335   |
| Friedrich-Petersen-Klinik                 | 46,9%      | 307   |
| Fachklinik Annabrunn                      | 46,7%      | 199   |
| Fachklinik Haus Möhringsburg              | 46,5%      | 155   |



## 1.1 Rückläuferquote

Katamnesedaten 2011 (Alkohol)

| Klinik                                     | Rückläufer | Fälle |
|--|------------|-------|
| Fachklinik St. Marienstift                 | 46,2%      | 383   |
| Fachklinik Höchsten                        | 45,6%      | 331   |
| Fachklinik Am Birkenweg Tagesrehabilitaion | 45,5%      | 66    |
| Fachklinik Magdalenenstift                 | 44,1%      | 136   |
| Fachklinik Bassum                          | 43,8%      | 203   |
| Fachklinik Haus Renchtal                   | 43,6%      | 319   |
| Fachklinik Haus Kraichtalblick             | 41,4%      | 152   |
| Fachklinik Weibersbrunn                    | 41,1%      | 258   |
| Fachkliniken Nordfriesland – Alkohol       | 40,7%      | 113   |
| Reha-Klinik St.Landelin                    | 39,8%      | 196   |
| St.Joseph Krankenhaus Weißensee            | 38,2%      | 55    |
| Fachklinik St. Camillus                    | 38,1%      | 239   |
| Fachklinik Mahlerthshof                    | 38,0%      | 171   |
| Fachklinik Holte-Lastrup                   | 37,6%      | 229   |
| Fachklinik Weinböhl                        | 37,3%      | 585   |
| Reha-Klinik Serrahn                        | 36,4%      | 154   |
| Fachklinik Klosterwald                     | 36,1%      | 277   |
| Fachklinik Schloß Falkenhof                | 35,5%      | 290   |
| Psychosoziale Klinik St. Martin            | 33,3%      | 120   |

7



## 1.1 Rückläuferquote

Katamnesedaten 2011 (Alkohol)

| Klinik                                | Rückläufer   | Fälle        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Fachklinik Schloß Mackenzell          | 32,7%        | 147          |
| Fachklinik St. Vitus                  | 31,6%        | 329          |
| Haus Burgwald                         | 31,0%        | 113          |
| Fachklinik Ringgenhof                 | 30,5%        | 525          |
| Therapiezentrum Münzesheim            | 30,1%        | 236          |
| Fachklinik Römerhaus                  | 25,8%        | 124          |
| Blaukreuz-Zentrum Kassel              | 25,6%        | 203          |
| Fachklinik Oldenburger Land Neerstedt | 25,4%        | 185          |
| PZN – Das Landhaus                    | 25,0%        | 48           |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>41,6%</b> | <b>9.463</b> |

|                                |                                  |                             |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Gesamtzahl<br/>Kliniken</b> | <b>Mittelwert<br/>Rückläufer</b> | <b>Gesamtzahl<br/>Fälle</b> | <b>Gesamtzahl<br/>Antwörter</b> |
| <b>47</b>                      | <b>41,6%</b>                     | <b>9.463</b>                | <b>3.939</b>                    |

8



## 1.1 Rückläuferquote – *Kommentar*

- Die Gesamtzahl der Fälle ist gegenüber dem Entlassungsjahrgang 2010 (10.546) deutlich auf 9.463 zurückgegangen.
- Die mittlere Antworter-Quote blieb stabil bei 41,6%. Absolut gesehen handelt es sich mit 3.939 um weniger Antworter (2010 = 4.323).
- Im vergangenen Jahr basierte die Auswertung auf Daten aus 53 Kliniken, in diesem Jahr sind es 47.

9



## 1.2 Berechnungsformen Abstinenz

- Erfolgsquote nur für planmäßig entlassene Patienten
  - DGSS 1: Anzahl abstinent Lebender bezogen auf die in der Katamneseuntersuchung erreichten Patienten (Antworter)
  - DGSS 2: Anzahl abstinent Lebender bezogen auf alle planmäßig entlassenen Patienten
- Erfolgsquote für alle entlassenen Patienten (Gesamte Ausgangsstichprobe)
  - DGSS 3: Anzahl abstinent Lebender bezogen auf die in der Katamneseuntersuchung erreichten Patienten (Antworter)
  - DGSS 4: Anzahl abstinent Lebender bezogen auf alle entlassenen Patienten

10



## 1.2 Definitionen Abstinenz

- Abstinenz =  
im letzten Jahr bzw. im Katamnesezeitraum  
kein Konsum von Alkohol, Drogen oder  
psychoaktiven Medikamenten (Substanzen)
- Abstinenz nach Rückfall =  
im letzten Monat des Katamnesezeitraums  
kein Konsum von Alkohol, Drogen oder  
psychoaktiven Medikamenten
- Rückfällig =  
je nach Berechnungsform ‚gesichert rückfällig‘  
bzw. ‚definiert rückfällig‘ (widersprüchliche  
Angaben und Nichtantworten)

11




## 1.2 Erfolgsquoten und Entlassformen

- Die sog. katamnestiche Erfolgsquote setzt  
sich aus den Anteilen für ‚Abstinenz‘ und  
‚Abstinenz nach Rückfall‘ zusammen
- Folgende Entlassformen gelten als planmäßig:
  - 1 = regulär
  - 2 = vorzeitig auf ärztliche Veranlassung
  - 3 = vorzeitig mit ärztlichem Einverständnis
  - 7 = Wechsel zu ambulanter, teilstationärer,  
stationärer Reha

12

## 1.2 Abstinenzquote nach DGSS 1

Katamnesedaten 2011 (Alkohol)




alle planmäßig entlassenen Antwortter

13

## 1.2 Abstinenzquote nach DGSS 2

Katamnesedaten 2011 (Alkohol)




alle planmäßig Entlassenen

14

## 1.2 Abstinenzquote nach DGSS 3

Katamnesedaten 2011 (Alkohol)



| Kategorie               | Fälle |
|-------------------------|-------|
| Abstinenz               | 2.464 |
| Abstinenz nach Rückfall | 689   |
| Rückfällig              | 621   |
| Definiert rückfällig    | 165   |
| Gesamt                  | 3.939 |


*definiert rückfällig = ohne Angabe*

alle entlassenen Antwortter

15

## 1.2 Abstinenzquote nach DGSS 4

Katamnesedaten 2011 (Alkohol)



| Kategorie               | Fälle |
|-------------------------|-------|
| Abstinenz               | 1.272 |
| Abstinenz nach Rückfall | 405   |
| Rückfällig              | 314   |
| Definiert rückfällig    | 2.065 |
| Gesamt                  | 4.056 |

*definiert rückfällig = ohne Angabe oder kein Rückläufer*

alle Entlassenen bei Rücklaufquote 45%

16



## 1.2 Abstinenzquote – *Kommentar*

- Die katamnesticen Erfolgsquoten für die Berechnungen, die nur auf den Antwortern basiert, liegen wie in den vergangenen Jahren bei ca. 80%.
  - DGSS 1:
    - 2005 = 66,5% / 2006 = 78,7% / 2007 = 78,1%
    - 2008 = 82,0% / 2009 = 79,9% / 2010 = 83,1%
    - 2011 = 81,1%
  - DGSS 3:
    - 2005 = 64,9% / 2006 = 76,5% / 2007 = 76,5%
    - 2008 = 82,9% / 2009 = 78,4% / 2010 = 81,5%
    - 2011 = 80,1%


17

## 1.2 Abstinenzquote – *Kommentar*

- Auch die katamnesticen Erfolgsquoten, bei denen die Berechnung auf der Gesamtzahl der Entlassenen bzw. planmäßig Entlassenen basiert, hat sich gegenüber den Vorjahren weiter stabilisiert .
  - DGSS 2:
    - 2005 = 28,8% / 2006 = 33,3% / 2007 = 33,7%
    - 2008 = 35,7% / 2009 = 36,0% / 2010 = 36,8%
    - 2011 = 36,5%
  - Für die katamnestiche Erfolgsquote nach DGSS 4 wird seit 2007 ein Mindestrücklauf von 45% festgelegt. Die Erfolgsquote ist gegenüber dem Vorjahr etwas gesunken.
    - DGSS 4: 2007 = 40,6% / 2008 = 39,2% / 2009 = 41,2% / 2010 = 42,7% / 2011 = 41,4%
    - zum Vergleich:  
Katamnese FVS Alkohol 2010: 43,3%

18

### 1.3 Selbsteinschätzung der Abstinenz



Leben Sie seit Behandlungsende durchgehend suchtmittelfrei?

### 1.3 Selbsteinschätzung – Kommentar

- Seit dem Entlassungsjahrgang 2008 wird bei positiver Selbsteinschätzung zwischen durchgängiger Abstinenz und Abstinenz innerhalb der letzten 30 Tage unterschieden.
- Diese Differenzierung hat zu keinen nennenswerten Unterschieden bei den Ergebnissen geführt. Der Anteil der durchgängig abstinenten Personen stabilisiert sich bei rund 26%.
  - 2005 = 24,0% / 2006 = 26,4% / 2007 = 27,0%
  - 2008 = 26,4% / 2009 = 26,4% / 2010 = 26,4%
  - 2011 = 26,4%

## Teil 2

| Nr.                                 | Merkmal  |
|-------------------------------------|--|
| <b>2. Sozio-demografische Daten</b> |  |
| 2.1                                 | Geschlecht   |
| 2.2                                 | Alter  |
| 2.3                                 | Partnersituation   |
| 2.4                                 | Erwerbssituation   |
| 2.5                                 | Hauptdiagnose  |
| 2.6                                 | Vorerfahrung <i>Entgiftung (entfällt in dieser Auswertung)</i> |
| 2.7                                 | Vorerfahrung <i>Entwöhnung (entfällt in dieser Auswertung)</i> |
| 2.8                                 | Art der Beendigung   |
| 2.9                                 | Behandlungsdauer   |
| 2.10                                | Vergleich Mittelwerte  |

jeweils Vergleich  
Katamnese - Stichprobe  
und Gesamt-Stichprobe

21

## 2.1 Geschlecht

| <b>Geschlecht</b> | <b>Antworte</b> | <b>Nicht-Antworte</b> | <b>Gesamt</b> |
|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Männlich</b>   | <b>75,5%</b>    | <b>76,4%</b>          | <b>76,0%</b>  |
| <b>Weiblich</b>   | <b>24,5%</b>    | <b>23,6%</b>          | <b>24,0%</b>  |
| <b>Gesamt</b>     | <b>100,0%</b>   | <b>100,0%</b>         | <b>100,0%</b> |

22



## 2.1 Geschlecht – *Kommentar*

- Der Anteil der Frauen in der Stichprobe ist gegenüber den Vorjahren wieder gesunken. Das Verhältnis Frauen/Männer beträgt ca. 1:3 wie in anderen vergleichbaren Statistiken.
  - 2005 = 23% / 2006 = 21% / 2007 = 25% / 2008 = 23% / 2009 = 21% / 2010 = 26% / 2011 = 24%
- Zum Vergleich der Frauenanteil in anderen Statistiken:
  - ‚buss‘ Basisdaten Alkohol 2011 = 25%
  - FVS Basisdokumentation Alkohol 2011 = 30%
  - DSHS 2011 Alkohol stationär = 28%

23



## 2.2 Alter

| <i>Alter bei Aufnahme gruppiert</i> | <i>Antworte</i> | <i>Nicht-Antworte</i> | <i>Gesamt</i> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 19 und jünger                       | 0,3%            | 0,5%                  | 0,4%          |
| 20 bis 29                           | 4,6%            | 12,2%                 | 9,1%          |
| 30 bis 39                           | 12,8%           | 21,6%                 | 17,9%         |
| 40 bis 49                           | 38,6%           | 37,5%                 | 38,0%         |
| 50 bis 59                           | 35,0%           | 24,0%                 | 28,6%         |
| 60 bis 69                           | 7,6%            | 3,6%                  | 5,3%          |
| 70 und älter                        | 1,2%            | 0,5%                  | 0,8%          |
| <b>Gesamt</b>                       | <b>100,0%</b>   | <b>100,0%</b>         | <b>100,0%</b> |

24



## 2.2 Alter – *Kommentar*

- Der Anstieg in der Altersgruppe über 49 setzt sich fort.

| Alter | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| <30   | 7,9  | 11,5 | 8,4  | 8,8  | 9,0  | 9,1  | 9,5  |
| 30-49 | 65,3 | 61,6 | 62,8 | 61,6 | 60,1 | 58,4 | 55,9 |
| >49   | 26,8 | 26,8 | 28,8 | 29,7 | 30,9 | 32,6 | 34,7 |

- Das Antwortverhalten dieser Altersgruppe ist zudem deutlich besser als bei den unter 49jährigen, hier überwiegen die Nicht-Antworter.

25



## 2.3 Partnersituation

| <i>Partnersituation<br/>(Beginn der Behandlung)</i> | <i>Antworte</i> | <i>Nicht-<br/>Antworte</i> | <i>Gesamt</i> |
|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| Keine Angabe  | 1,8%            | 2,0%                       | 1,9%          |
| Alleinstehend                                       | 44,7%           | 51,2%                      | 48,5%         |
| Zeitweilige Beziehungen                             | 4,2%            | 6,5%                       | 5,5%          |
| Feste Beziehung                                     | 48,8%           | 39,7%                      | 43,5%         |
| Sonstige  | 0,6%            | 0,6%                       | 0,6%          |
| Gesamt  | 100,0%          | 100,0%                     | 100,0%        |

26



## 2.3 Partnersituation – *Kommentar*

- Der Anteil der Patienten in fester Beziehung hat sich über die Jahre kaum verändert.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 44%  | 43%  | 44%  | 44%  | 43%  | 46%  | 44%  |

- Der Anteil der Alleinstehenden hat wieder zugenommen.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 41%  | 42%  | 42%  | 46%  | 50%  | 46%  | 49%  |

- Das Antwortverhalten von Personen in fester Beziehung ist erwartungsgemäß besser als bei Alleinstehenden.

27



## 2.4 Erwerbssituation

| <i>Erwerbssituation<br/>(Beginn der Behandlung)</i> | <i>Antworte</i> | <i>Nicht-<br/>Antworte</i> | <i>Gesamt</i> |
|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| Keine Angabe  | 1,7%            | 2,0%                       | 1,9%          |
| Auszubildender                                      | 0,5%            | 0,7%                       | 0,6%          |
| Arbeiter / Angestellter / Beamter                   | 39,9%           | 28,8%                      | 33,4%         |
| Selbständiger / Freiberufler                        | 2,1%            | 1,6%                       | 1,8%          |
| Sonstige Erwerbspersonen                            | 0,5%            | 0,8%                       | 0,7%          |
| In beruflicher Rehabilitation                       | 0,4%            | 0,6%                       | 0,5%          |
| Arbeitslos nach SGB III (Bezug von ALG I)           | 11,6%           | 10,8%                      | 11,1%         |
| Arbeitslos nach SGB II (Bezug von ALG II)           | 26,8%           | 40,6%                      | 34,8%         |
| Schüler / Student                                   | 0,3%            | 0,3%                       | 0,3%          |
| Hausfrau / Hausmann                                 | 3,1%            | 2,3%                       | 2,6%          |
| Rentner / Pensionär                                 | 9,6%            | 6,9%                       | 8,0%          |
| Sonstige Nichterwerbspersonen                       | 3,5%            | 4,7%                       | 4,2%          |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>100,0%</b>   | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |

28



## 2.4 Erwerbssituation – *Kommentar*

- Der Anteil der Arbeitslosen in der Stichprobe hat etwas abgenommen (ab 2007 Anstieg durch Umstellung der Items im Kerndatensatz).

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 27%  | 29%  | 45%  | 47%  | 51%  | 50%  | 46%  |

- Erwerbstätige Personen weisen ein besseres Antwortverhalten auf als nicht Erwerbstätige.
- Erwerbstätigkeit kann neben Beziehungsstatus und Alter als Faktor für eine höhere Antwortbereitschaft gesehen werden.

29



## 2.5 Hauptdiagnose

| <i>Hauptdiagnose Sucht<br/>(gruppiert nach den ersten 3 Stellen<br/>nach ICD-10)</i> | <i>Antworte</i> | <i>Nicht-<br/>Antworte</i> | <i>Gesamt</i> |
|--|-----------------|----------------------------|---------------|
| F10 Alkohol  | 96,9%           | 93,5%                      | 94,9%         |
| F11 Opioide  | 0,8%            | 2,0%                       | 1,5%          |
| F12 Cannabis   | 0,7%            | 1,9%                       | 1,4%          |
| F13 Sedativa Hypnotika   | 0,6%            | 0,7%                       | 0,7%          |
| F14 Kokain   | 0,2%            | 0,4%                       | 0,3%          |
| F15 Stimulanzien   | 0,3%            | 0,6%                       | 0,5%          |
| F15 Halluzinogene  | 0,1%            | 0,0%                       | 0,0%          |
| F17 Tabak  | 0,1%            | 0,2%                       | 0,1%          |
| F18 Lösungsmittel  | 0,0%            | 0,0%                       | 0,0%          |
| F19 Mehrfachabhängig   | 0,4%            | 0,7%                       | 0,6%          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>100,0%</b>   | <b>100,0%</b>              | <b>100,0%</b> |

30



## 2.5 Hauptdiagnose – *Kommentar*

- Der Anteil der Patienten mit der Hauptdiagnose Alkoholabhängigkeit ist relativ konstant und aufgrund der Stichprobenauswahl von Alkohol-Einrichtungen dominant.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 87%  | 80%  | 96%  | 95%  | 95%  | 94%  | 95%  |

- Erwartungsgemäß finden sich unter den Alkoholabhängigen etwas mehr Antwortter als in den übrigen Gruppen.

31



## 2.8 Art der Beendigung

| <i>Art der Beendigung</i>   | <i>Antwortter</i> | <i>Nicht-Antwortter</i> | <i>Gesamt</i> |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| Keine Angabe  | 0,0%              | 0,1%                    | 0,0%          |
| Regulär nach Beratung / Behandlungsplan   | 72,4%             | 57,9%                   | 63,9%         |
| Vorzeitig auf ärztliche / therapeutische Veranlassung                             | 2,0%              | 5,2%                    | 3,9%          |
| Vorzeitig mit ärztlichem / therapeutischem Einverständnis                         | 4,5%              | 5,2%                    | 4,9%          |
| Vorzeitig ohne ärztliches / therapeutisches Einverständnis - Abbruch durch Klient | 4,6%              | 13,4%                   | 9,7%          |
| Disziplinarisch - Abbruch durch die Einrichtung                                   | 1,0%              | 3,6%                    | 2,5%          |
| Außerplanmäßige Verlegung   | 0,5%              | 1,3%                    | 1,0%          |
| Planmäßiger Wechsel in andere Behandlungsform                                     | 15,0%             | 13,2%                   | 13,9%         |
| Verstorben  | 0,0%              | 0,0%                    | 0,0%          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>100,0%</b>     | <b>100,0%</b>           | <b>100,0%</b> |

32





## 2.8 Art der Beendigung – *Kommentar*

- Der Anteil der planmäßigen Entlassungen (Haltequote) hat sich in der Stichprobe auf vergleichbar hohem Niveau stabilisiert.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 76%  | 77%  | 84%  | 86%  | 85%  | 86%  | 87%  |

- Es antworten erwartungsgemäß eher Patienten mit planmäßigem Therapieende.
- Zum Vergleich FVS Basisdokumentation Alkohol 2011 = 86,6 %

33



## 2.9 Behandlungsdauer

| Behandlungsdauer | Antworte | Nicht-Antworte | Gesamt |
|------------------|----------|----------------|--------|
| Bis 2 Wochen     | 1,4%     | 5,3%           | 3,7%   |
| Bis 4 Wochen     | 2,3%     | 5,1%           | 3,9%   |
| Bis 6 Wochen     | 6,1%     | 8,1%           | 7,3%   |
| Bis 8 Wochen     | 9,0%     | 9,5%           | 9,3%   |
| Bis 10 Wochen    | 7,5%     | 6,8%           | 7,1%   |
| Bis 12 Wochen    | 20,6%    | 18,7%          | 19,5%  |
| Bis 14 Wochen    | 12,1%    | 10,9%          | 11,4%  |
| Bis 16 Wochen    | 32,6%    | 27,3%          | 29,5%  |
| Bis 18 Wochen    | 3,1%     | 3,4%           | 3,3%   |
| Bis 20 Wochen    | 3,4%     | 2,4%           | 2,8%   |
| Bis 22 Wochen    | 0,8%     | 0,8%           | 0,8%   |
| Bis 24 Wochen    | 0,7%     | 0,9%           | 0,8%   |
| Bis 26 Wochen    | 0,1%     | 0,6%           | 0,4%   |
| Über 26 Wochen   | 0,3%     | 0,4%           | 0,3%   |
| Gesamt           | 100,0%   | 100,0%         | 100,0% |

34



## 2.9 Behandlungsdauer – *Kommentar*

- Die Verteilung der Behandlungsdauern hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.
  - bis 6 Wochen = 15% (2005-2010 = 14-17%)
  - 6 bis 12 Wochen = 36% (2005-2010 = 34-36%)
  - 12 bis 14 Wochen = 11% (2005-2010 = 7-13%)
  - 14 bis 16 Wochen = 30% (2005-2010 = 29-32%)
  - über 16 Wochen = 8% (2005-2010 = 9-10%)
- Es antworten eher Patienten mit Behandlungsdauern über 8 Wochen (2010 >10 Wochen).

35



## 2.10 Vergleich der Mittelwerte

| <i>Mittelwerte</i>         | <i>Antworte</i> | <i>Nicht-Antworte</i> | <i>Gesamt</i> |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| Alter bei Betreuungsbeginn | 47,5            | 43,0                  | 44,9          |
| Behandlungsdauer           | 88,1            | 80,9                  | 83,9          |

36



## 2.10 Mittelwerte – *Kommentar*

- Das Durchschnittsalter der Stichprobe ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben.

| 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 44 J. | 43 J. | 44 J. | 44 J. | 45 J. | 45 J. | 45 J. |

- Die Altersdifferenz zwischen Antwortern (älter) und Nicht-Antwortern (jünger) ist gestiegen.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 J. | 4 J. | 3 J. | 4 J. | 3 J. | 3 J. | 5 J. |

- Die Aussage aus Item 2.2 wird bestätigt: Je älter die Patienten sind, desto eher antworten sie bei der Katamnese.

37



## 2.10 Mittelwerte – *Kommentar*

- Die durchschnittliche Behandlungsdauer der Stichprobe hat sich kaum verändert.

| 2005  | 2006 | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 84 T. | 83T. | 85 T. | 85 T. | 84 T. | 85 T. | 84 T. |

- Die Differenz der Behandlungsdauern zwischen Antwortern (länger) und Nicht-Antwortern (kürzer) ist gleich geblieben.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 T. | 9 T. | 7 T. | 6 T. | 9 T. | 7 T. | 7 T. |

- Die Aussage aus Item 2.9 wird bestätigt: Je länger die Patienten in Behandlung sind, desto eher antworten sie bei der Katamnese.

38

## Teil 3

| Nr.   | Merkmal  |
|---|--|
| <b>3. Häufigkeiten Katamnese-Stichprobe</b> |  |
| 3.1   | Partnersituation                                     |
| 3.2   | Lebenssituation (wird nicht mehr abgefragt)          |
| 3.3   | Wohnsituation (entfällt in dieser Auswertung)        |
| 3.4   | Erwerbssituation                                     |
| 3.5   | Einrichtungskontakte (entfällt in dieser Auswertung) |
| 3.6   | Zufriedenheit mit der Behandlung                     |

### Auswertung der Antworten zum Katamnesezeitpunkt

39

## 3.1 Partnersituation

| Partnersituation zum Katamnesezeitpunkt | Fälle        | Anteile       |
|---|--------------|---------------|
| Keine Angabe                            | 179          | 4,5%          |
| Alleinstehend                           | 1.412        | 35,8%         |
| Zeitweilige Beziehungen                 | 303          | 7,7%          |
| Feste Beziehung                         | 1.953        | 49,6%         |
| Sonstige                                | 92           | 2,3%          |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

40

### 3.1 Partnersituation – *Kommentar*

- Die Anteile und Relationen zur Partnersituation haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

- Alleinstehend:

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|
| 35%  | 35%  | 37%  | 38%  | 36%  | 36%  |

- Zeitweilige Beziehung:

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|
| 9%   | 8%   | 8%   | 9%   | 8%   | 8%   |

- Feste Beziehung:

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|
| 51%  | 52%  | 50%  | 48%  | 52%  | 50%  |

41

### 3.4 Erwerbssituation

| <i>Erwerbssituation zum Katamnesezeitpunkt</i> | <i>Fälle</i> | <i>Anteil</i> |
|--|--------------|---------------|
| Keine Angabe                                   | 128          | 3,2%          |
| Auszubildender                                 | 32           | 0,8%          |
| Arbeiter / Angestellter / Beamter              | 1.730        | 43,9%         |
| Selbständiger / Freiberufler                   | 102          | 2,6%          |
| Sonstige Erwerbspersonen                       | 12           | 0,3%          |
| In beruflicher Rehabilitation                  | 77           | 2,0%          |
| Arbeitslos nach SGB III (Bezug von ALG I)      | 212          | 5,4%          |
| Arbeitslos nach SGB II (Bezug von ALG II)      | 781          | 19,8%         |
| Schüler / Student                              | 15           | 0,4%          |
| Hausfrau / Hausmann                            | 93           | 2,4%          |
| Rentner / Pensionär                            | 577          | 14,6%         |
| Sonstige Nichterwerbspersonen                  | 180          | 4,6%          |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

42



### 3.4 Erwerbssituation – *Kommentar*

- Insgesamt gab es bei den Katamnese-Teilnehmern 2011 gegenüber den Entlassungsjahrgängen 2005 bis 2010 nur geringfügige Verschiebungen im Hinblick auf die Erwerbssituation.
- Der Anteil der Arbeitslosen (Bezug von ALG I oder ALG II) unter den Antwortern ist weiter gesunken.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 25%  | 30%  | 29%  | 30%  | 32%  | 27%  | 25%  |



### 3.6 Zufriedenheit mit Behandlung

| <i>Zufriedenheit mit der Behandlung</i> | <i>Fälle</i> | <i>Anteil</i> |
|---|--------------|---------------|
| Keine Angaben                           | 249          | 6,3%          |
| Sehr zufrieden                          | 1.936        | 49,1%         |
| Zufrieden                               | 1.205        | 30,6%         |
| Eher zufrieden                          | 310          | 7,9%          |
| Eher unzufrieden                        | 125          | 3,2%          |
| Unzufrieden                             | 63           | 1,6%          |
| Sehr unzufrieden                        | 51           | 1,3%          |
| Gesamt                                  | 3.939        | 100,0%        |

Hat sich die Behandlung für Sie gelohnt?

### 3.6 Zufriedenheit – *Kommentar*

- Die Zufriedenheit mit der Behandlung der Katamnese-Antwortern bleibt konstant.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 81%  | 80%  | 80%  | 82%  | 80%  | 79%  | 80%  |

## Teil 4

| Nr.                     | Merkmal  |
|-------------------------|--|
| <b>4. Kreuztabellen</b> |  |
| 4.1                     | Partnersituation (Behandlungs-Beginn und Katamnese-Zeitpunkt – DGSS 3) |
| 4.2                     | Erwerbssituation (Behandlung-Beginn und Katamnese-Zeitpunkt – DGSS 3)  |
| 4.3                     | Geschlecht und Abstinenz – DGSS 3                                      |
| 4.4                     | Alter und Abstinenz – DGSS 3   |
| 4.5                     | Vorerfahrung Entgiftung und Abstinenz – DGSS 1                         |
| 4.6                     | Vorerfahrung Entwöhnung und Abstinenz – DGSS 1                         |
| 4.7                     | Partnersituation und Abstinenz – DGSS 3                                |
| 4.8                     | Erwerbssituation und Abstinenz – DGSS 3                                |
| 4.9                     | Art der Beendigung und Abstinenz – DGSS 3                              |
| 4.10                    | Geschlechtsspezifische Einrichtung und Abstinenz (Frauen) – DGSS 3     |
| 4.11                    | Geschlechtsspezifische Einrichtung und Abstinenz (Männer) – DGSS 3     |
| 4.12                    | Behandlungsdauer und Abstinenz – DGSS 3                                |

## 4.1 Partnersituation im Verlauf

Katamnese-Zeitpunkt

| Behandlungs-Beginn | DGSS 3 | Keine Angabe |       | Alleinstehend |       | In Partnerschaft |       | Gesamt |  |
|--------------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|--------|--|
|                    |        |              |       |               |       |                  |       |        |  |
| Keine Angabe       | 4      | 5,8%         | 36    | 52,2%         | 29    | 42,0%            | 69    | 100,0% |  |
| Alleinstehend      | 125    | 6,4%         | 1.441 | 74,0%         | 381   | 19,6%            | 1.947 | 100,0% |  |
| In Partnerschaft   | 142    | 7,4%         | 238   | 12,4%         | 1543  | 80,2%            | 1.923 | 100,0% |  |
| Gesamt             | 271    | 6,9%         | 1.715 | 43,5%         | 1.953 | 49,6%            | 3.939 | 100,0% |  |

47

## 4.1 Partnersituation – Kommentar

- Der Anteil der Personen, die zu Behandlungs-Beginn alleinstehend waren und das zum Katamnese-Zeitpunkt geblieben sind, ist weiter etwas gesunken.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 70%  | 79%  | 76%  | 80%  | 78%  | 77%  | 74%  |

- Der Anteil der Personen, die zu Behandlungs-Beginn in Partnerschaft lebten und auch zum Katamnese-Zeitpunkt in Partnerschaft waren, ist ebenfalls leicht gesunken.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 85%  | 80%  | 82%  | 81%  | 79%  | 82%  | 80%  |

- Beide Gruppen sind zu beiden Messzeitpunkten etwa gleich verteilt, die Veränderung der Partnersituation ist also eher die Ausnahme.

48



## 4.2 Erwerbssituation im Verlauf

Katamnese-Zeitpunkt

| DGSS 3             | Keine Angabe |        | Erwerbstätig |        | Arbeitslos |        | Nicht erwerbstätig |        | Gesamt |        |
|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                    | Anzahl       | Anteil | Anzahl       | Anteil | Anzahl     | Anteil | Anzahl             | Anteil | Anzahl | Anteil |
| Keine Angabe       | 1            | 1,5%   | 37           | 54,4%  | 16         | 23,5%  | 14                 | 20,6%  | 68     | 100,0% |
| Erwerbstätig       | 62           | 3,6%   | 1.302        | 76,1%  | 176        | 10,3%  | 170                | 9,9%   | 1.710  | 100,0% |
| Arbeitslos         | 43           | 2,8%   | 501          | 33,2%  | 748        | 49,5%  | 219                | 14,5%  | 1.511  | 100,0% |
| Nicht erwerbstätig | 22           | 3,4%   | 113          | 17,4%  | 53         | 8,2%   | 462                | 71,1%  | 650    | 100,0% |
| Gesamt             | 128          | 3,2%   | 1.953        | 49,6%  | 993        | 25,2%  | 865                | 22,0%  | 3.939  | 100,0% |

Behandlungs-Beginn

49

## 4.2 Erwerbssituation – Kommentar

- Der Anteil der Personen, die zu Behandlungs-Beginn und zum Katamnese-Zeitpunkt erwerbstätig waren, ist wieder etwas gesunken.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 80%  | 65%  | 80%  | 78%  | 79%  | 80%  | 76%  |

- Der Anteil der Personen, die zu Behandlungs-Beginn arbeitslos und zum Katamnese-Zeitpunkt erwerbstätig waren, ging leicht zurück.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 30%  | 33%  | 32%  | 30%  | 29%  | 35%  | 33%  |

50



### 4.3 Geschlecht und Abstinenz

| DGSS 3   | Abstinenz |       | Abstinenz nach Rückfall |       | Rückfällig |       | Definiert rückfällig |      | Gesamt |        |
|----------|-----------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|----------------------|------|--------|--------|
| Männlich | 1.862     | 62,6% | 490                     | 16,5% | 477        | 16,0% | 145                  | 4,9% | 2.974  | 100,0% |
| Weiblich | 602       | 62,4% | 199                     | 20,6% | 144        | 14,9% | 20                   | 2,1% | 965    | 100,0% |
| Gesamt   | 2.464     | 62,6% | 689                     | 17,5% | 621        | 15,8% | 165                  | 4,2% | 3.939  | 100,0% |



### 4.3 Geschlecht – *Kommentar*

- Die Anteile der zum Katamnese-Zeitpunkt abstinenten Personen liegen etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

|        | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frauen | 45%  | 64%  | 62%  | 60%  | 61%  | 62%  | 62%  |
| Männer | 52%  | 65%  | 65%  | 65%  | 63%  | 65%  | 63%  |

- Der Anteil der Personen, die nach Rückfall abstinent sind, ist bei den Frauen weiterhin etwas höher.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 7%   | 3%   | 4%   | 5%   | 3%   | 4%   |

- Die Anteile der zum Katamnese-Zeitpunkt rückfälligen Personen liegen etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

|        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Frauen | 17%  | 22%  | 18%  | 19%  | 18%  | 15%  |
| Männer | 24%  | 21%  | 16%  | 20%  | 18%  | 16%  |

## 4.4 Alter bei Aufnahme und Abstinenz

| DGSS 3        | Abstinent    |              | Abstinent nach Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert rückfällig |             | Gesamt       |               |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|               | Anzahl       | Anteil       | Anzahl                  | Anteil       | Anzahl     | Anteil       | Anzahl               | Anteil      | Anzahl       | Anteil        |
| 19 und jünger | 3            | 27,3%        | 5                       | 45,5%        | 3          | 27,3%        | 0                    | 0,0%        | 11           | 100,0%        |
| 20 bis 29     | 84           | 46,4%        | 46                      | 25,4%        | 42         | 23,2%        | 9                    | 5,0%        | 181          | 100,0%        |
| 30 bis 39     | 274          | 54,4%        | 108                     | 21,4%        | 100        | 19,8%        | 22                   | 4,4%        | 504          | 100,0%        |
| 40 bis 49     | 957          | 63,0%        | 270                     | 17,8%        | 236        | 15,5%        | 57                   | 3,8%        | 1.520        | 100,0%        |
| 50 bis 59     | 910          | 66,0%        | 210                     | 15,2%        | 195        | 14,2%        | 63                   | 4,6%        | 1.378        | 100,0%        |
| 60 bis 69     | 202          | 67,8%        | 44                      | 14,8%        | 41         | 13,8%        | 11                   | 3,7%        | 298          | 100,0%        |
| 70 und älter  | 34           | 72,3%        | 6                       | 12,8%        | 4          | 8,5%         | 3                    | 6,4%        | 47           | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b> | <b>2.464</b> | <b>62,6%</b> | <b>689</b>              | <b>17,5%</b> | <b>621</b> | <b>15,8%</b> | <b>165</b>           | <b>4,2%</b> | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

53

## 4.4 Alter – Kommentar

- Die katamnestische Erfolgsquote hat sich in den mittleren Altersgruppen gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.
- Die Altersgruppen ‚unter 19‘ und ‚über 70‘ sind wegen der geringen Fallzahlen kaum zu interpretieren.
- Mit zunehmendem Alter steigt die katamnestische Erfolgsquote. Dabei steigt die durchgängige Abstinenz mit dem Alter, während die Abstinenz nach Rückfall abnimmt.

54

## 4.5 Vorerfahrung Entgiftung und Abstinenz



| DGSS 1        | Abstinenz    |              | Abstinenz nach Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert rückfällig |             | Gesamt       |               |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nein          | 330          | 64,0%        | 74                      | 14,3%        | 63         | 12,2%        | 49                   | 9,5%        | 516          | 100,0%        |
| Ja            | 1.187        | 55,9%        | 467                     | 22,0%        | 400        | 18,8%        | 71                   | 3,3%        | 2.125        | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.517</b> | <b>57,4%</b> | <b>541</b>              | <b>20,5%</b> | <b>463</b> | <b>17,5%</b> | <b>120</b>           | <b>4,5%</b> | <b>2.641</b> | <b>100,0%</b> |

## 4.5 Vorerfahrung Entgiftung – Kommentar



- Die katamnestische Erfolgsquote bei Personen mit und ohne vorhergehender Entgiftung hat sich angeglichen.

|      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| mit  | 76%  | 72%  | 77%  | 74%  | 79%  | 78%  |
| ohne | 77%  | 79%  | 84%  | 82%  | 84%  | 78%  |

- Bei vorhandener Entgiftung ist allerdings die Abstinenz nach Rückfall im Verhältnis deutlich häufiger.

|      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| mit  | 21%  | 15%  | 23%  | 20%  | 21%  | 22%  |
| ohne | 12%  | 11%  | 12%  | 12%  | 16%  | 14%  |

## 4.6 Vorerfahrung Entwöhnung und Abstinenz



| DGSS 1 | Abstinenz |         | Abstinenz nach Rückfall |         | Rückfällig |         | Definiert rückfällig |         | Gesamt |         |
|--------|-----------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|----------------------|---------|--------|---------|
|        | Anzahl    | Prozent | Anzahl                  | Prozent | Anzahl     | Prozent | Anzahl               | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Nein   | 1.178     | 65,7%   | 271                     | 15,1%   | 258        | 14,4%   | 86                   | 4,8%    | 1.793  | 100,0%  |
| Ja     | 540       | 58,0%   | 189                     | 20,3%   | 170        | 18,3%   | 32                   | 3,4%    | 931    | 100,0%  |
| Gesamt | 1.718     | 63,1%   | 460                     | 16,9%   | 428        | 15,7%   | 118                  | 4,3%    | 2.724  | 100,0%  |

57

## 4.6 Vorerfahrung Entwöhnung – Kommentar



- Die katamnestische Erfolgsquote ist bei Therapie-Wiederholern deutlich geringer als bei Erstbehandelten, was vermutlich auf eine stärkere Chronifizierung des Krankheitsverlaufs zurückzuführen ist.

|                | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Erstbehandlung | 78%  | 84%  | 84%  | 84%  | 89%  |
| Wiederholung   | 70%  | 74%  | 74%  | 79%  | 78%  |

- Allerdings liegt die Abstinenz nach Rückfall bei Therapie-Wiederholern ca. 5% höher.

58



## 4.7 Partnerschaft und Abstinenz

| DGSS 3           | Abstinenz    |              | Abstinenz nach Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert rückfällig |             | Gesamt       |               |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|                  | Anzahl       | Prozent      | Anzahl                  | Prozent      | Anzahl     | Prozent      | Anzahl               | Prozent     | Anzahl       | Prozent       |
| Keine Angabe     | 103          | 38,0%        | 31                      | 11,4%        | 27         | 10,0%        | 110                  | 40,6%       | 271          | 100,0%        |
| Alleinstehend    | 956          | 55,7%        | 353                     | 20,6%        | 377        | 22,0%        | 29                   | 1,7%        | 1.715        | 100,0%        |
| In Partnerschaft | 1.405        | 71,9%        | 305                     | 15,6%        | 217        | 11,1%        | 26                   | 1,3%        | 1.953        | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b>    | <b>2.464</b> | <b>62,6%</b> | <b>689</b>              | <b>17,5%</b> | <b>621</b> | <b>15,8%</b> | <b>165</b>           | <b>4,2%</b> | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

59



## 4.7 Partnerschaft – Kommentar

- Eine Partnerschaft wirkt sich günstig auf die katamnestische Erfolgsquote aus.

|               | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alleinstehend | 61%  | 68%  | 70%  | 76%  | 74%  | 76%  | 76%  |
| Partner       | 68%  | 83%  | 83%  | 86%  | 84%  | 87%  | 88%  |

60

## 4.8 Erwerbssituation und Abstinenz

| DGSS 3             | Abstinenz    |              | Abstinenz nach Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert rückfällig |             | Gesamt       |               |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|                    | Anzahl       | Anteil       | Anzahl                  | Anteil       | Anzahl     | Anteil       | Anzahl               | Anteil      | Anzahl       | Anteil        |
| Keine Angabe       | 18           | 14,1%        | 4                       | 3,1%         | 4          | 3,1%         | 102                  | 79,7%       | 128          | 100,0%        |
| Erwerbstätig       | 1.451        | 74,3%        | 280                     | 14,3%        | 193        | 9,9%         | 29                   | 1,5%        | 1.953        | 100,0%        |
| Arbeitslos         | 451          | 45,4%        | 251                     | 25,3%        | 263        | 26,5%        | 28                   | 2,8%        | 993          | 100,0%        |
| Nicht erwerbstätig | 544          | 62,9%        | 154                     | 17,8%        | 161        | 18,6%        | 6                    | 0,7%        | 865          | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b>      | <b>2.464</b> | <b>62,6%</b> | <b>689</b>              | <b>17,5%</b> | <b>621</b> | <b>15,8%</b> | <b>165</b>           | <b>4,2%</b> | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

61

## 4.8 Erwerbssituation – *Kommentar*

- Der Trend der Vorjahre setzt sich fort: Erwerbstätige weisen eine deutlich bessere Erfolgsquote auf.

|              | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitslos   | 55%  | 65%  | 66%  | 72%  | 67%  | 71%  | 71%  |
| Erwerbstätig | 71%  | 84%  | 85%  | 88%  | 87%  | 89%  | 89%  |

62

## 4.9 Art der Beendigung und Abstinenz

| DGSS 3                  | Abstinenz    |              | Abstinenz nach Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert rückfällig |             | Gesamt       |               |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|                         | Anzahl       | Anteil       | Anzahl                  | Anteil       | Anzahl     | Anteil       | Anzahl               | Anteil      | Anzahl       | Anteil        |
| Planmäßige Entlassung   | 2.367        | 64,0%        | 632                     | 17,1%        | 542        | 14,7%        | 158                  | 4,3%        | 3.699        | 100,0%        |
| Unplanmäßige Entlassung | 97           | 40,4%        | 57                      | 23,8%        | 79         | 32,9%        | 7                    | 2,9%        | 240          | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b>           | <b>2.464</b> | <b>62,6%</b> | <b>689</b>              | <b>17,5%</b> | <b>621</b> | <b>15,8%</b> | <b>165</b>           | <b>4,2%</b> | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

## 4.9 Art der Beendigung – *Kommentar*

- Wie in den Vorjahren zeigt sich, dass die Abstinenzquote nach planmäßiger Entlassung deutlich besser ist.

|             | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Planmäßig   | 67%  | 79%  | 78%  | 82%  | 80%  | 83%  | 81%  |
| Unplanmäßig | 53%  | 59%  | 58%  | 65%  | 57%  | 60%  | 64%  |



## 4.10 Geschlechtsspezifische Einrichtung und Abstinenz



| Frauen<br>DGSS 3     | Abstinenz |         | Abstinenz<br>nach<br>Rückfall |         | Rückfällig |         | Definiert<br>rückfällig |         | Gesamt |         |
|----------------------|-----------|---------|-------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|
|                      | Anzahl    | Prozent | Anzahl                        | Prozent | Anzahl     | Prozent | Anzahl                  | Prozent | Anzahl | Prozent |
| nur Frauen           | 268       | 63,4%   | 89                            | 21,0%   | 61         | 14,4%   | 5                       | 1,2%    | 423    | 100,0%  |
| Frauen und<br>Männer | 334       | 61,6%   | 110                           | 20,3%   | 83         | 15,3%   | 15                      | 2,8%    | 542    | 100,0%  |
| Gesamt               | 602       | 62,4%   | 199                           | 20,6%   | 144        | 14,9%   | 20                      | 2,1%    | 965    | 100,0%  |

## 4.10 Geschlechtsspezifische Einrichtung – *Kommentar*



- Patientinnen aus gemischten und geschlechtsspezifischen Einrichtungen weisen ähnliche Abstinenzquoten auf.

| Einrichtung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Spezifisch  | 65%  | 80%  | 77%  | 74%  | 81%  | 80%  | 84%  |
| Gemischt    | 65%  | 82%  | 77%  | 84%  | 81%  | 82%  | 82%  |

- Es zeigen sich leichte Unterschiede bei den Kategorien ‚abstinenz‘ und ‚abstinenz nach Rückfall‘ zwischen den Einrichtungsarten, die sich im Verlauf aber uneinheitlich entwickeln.

## 4.11 Geschlechtsspezifische Einrichtung und Abstinenz



| Männer<br>DGSS 3     | Abstinenz    |              | Abstinenz<br>nach<br>Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert<br>rückfällig |             | Gesamt       |               |
|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                      | Anzahl       | Prozent      | Anzahl                        | Prozent      | Anzahl     | Prozent      | Anzahl                  | Prozent     | Anzahl       | Prozent       |
| Frauen und<br>Männer | 1.065        | 63,4%        | 302                           | 18,0%        | 281        | 16,7%        | 31                      | 1,8%        | 1.679        | 100,0%        |
| nur Männer           | 797          | 61,6%        | 187                           | 14,5%        | 196        | 15,1%        | 114                     | 8,8%        | 1.294        | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b>        | <b>1.862</b> | <b>62,6%</b> | <b>489</b>                    | <b>16,5%</b> | <b>477</b> | <b>16,0%</b> | <b>145</b>              | <b>4,9%</b> | <b>2.973</b> | <b>100,0%</b> |

## 4.11 Geschlechtsspezifische Einrichtung – *Kommentar*



- Bei den Männern zeigen die katamnestischen Erfolgsquoten eine uneinheitliche Entwicklung: Während 2010 die geschlechts-spezifischen Einrichtungen eine höhere Quote hatten, sind es 2011 die gemischten Einrichtungen.

| Einrichtung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Spezifisch  | 65%  | 83%  | 78%  | 82%  | 77%  | 84%  | 76%  |
| Gemischt    | 64%  | 73%  | 76%  | 81%  | 79%  | 80%  | 81%  |

## 4.12 Behandlungsdauer und Abstinenz

| DGSS 3                | Abstinenz    |              | Abstinenz nach Rückfall |              | Rückfällig |              | Definiert rückfällig |             | Gesamt       |               |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
|                       | Anzahl       | Anteil       | Anzahl                  | Anteil       | Anzahl     | Anteil       | Anzahl               | Anteil      | Anzahl       | Anteil        |
| Bis 6 Wochen          | 218          | 56,2%        | 75                      | 19,3%        | 77         | 19,8%        | 18                   | 4,6%        | 388          | 100,0%        |
| Über 6 bis 10 Wochen  | 382          | 58,9%        | 139                     | 21,4%        | 102        | 15,7%        | 26                   | 4,0%        | 649          | 100,0%        |
| Über 10 bis 16 Wochen | 1.663        | 64,6%        | 415                     | 16,1%        | 394        | 15,3%        | 103                  | 4,0%        | 2.575        | 100,0%        |
| Über 16 bis 20 Wochen | 160          | 63,0%        | 43                      | 16,9%        | 38         | 15,0%        | 13                   | 5,1%        | 254          | 100,0%        |
| Über 20 Wochen        | 41           | 56,2%        | 17                      | 23,3%        | 10         | 13,7%        | 5                    | 6,8%        | 73           | 100,0%        |
| <b>Gesamt</b>         | <b>2.464</b> | <b>62,6%</b> | <b>689</b>              | <b>17,5%</b> | <b>621</b> | <b>15,8%</b> | <b>165</b>           | <b>4,2%</b> | <b>3.939</b> | <b>100,0%</b> |

69

## 4.12 Behandlungsdauer – Kommentar

- Die Abstinenzquoten der verschiedenen Behandlungsdauern weichen kaum von der Regelbehandlung (10-16 Wochen) ab.

| Behandlungsdauer | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 6-10 Wochen      | 75%  | 77%  | 79%  | 77%  | 81%  | 80%  |
| 10-16 Wochen     | 77%  | 78%  | 82%  | 80%  | 83%  | 81%  |
| 16-20 Wochen     | 76%  | 73%  | 81%  | 80%  | 81%  | 80%  |

- Es ist davon auszugehen, dass die Behandlungen im individuell passenden Setting bei angemessener Dauer stattfinden und zu guten Resultaten führen.

70